



LEÓN
PHARMA
LABORATORIO VETERINARIO




 **Vademecum**

*Línea de medicamentos veterinarios
para **grandes y pequeños animales***

Oxiflex L.A.

Antibiótico de amplio espectro.

Solución inyectable



- ☑ Larga acción
- ☑ Antiinflamatorio
- ☑ Analgésico
- ☑ Antipirético



Índice

Antibióticos	.03
Antidiarreicos	.09
Antifúngicos	.11
Antiinflamatorios	.13
Antiparasitarios	.17
Antisépticos	.23
Reproductivos	.27
Vitamínicos y mineralizantes	.31
Belleza	.35

Tilflex 375[®]

Antibiótico de amplio espectro
y antiinflamatorio.

Solución inyectable



- Tratamiento de enfermedades respiratorias bovinas.
- Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina.
- Pododermatitis o Pietín



- Actúa sobre el dolor, inflamación y/o hiperpirexia asociados.



Antibióticos

Oxilon 200 L.A.



Oxitetraciclina Base 20%.

Antibiótico de amplio espectro.

Larga acción.

Solución inyectable.

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y

caninos: 1 ml cada 10 kg.

Aves: 0,25 ml por kg.

Aplicar por vía subcutánea o

intramuscular.

Presentación: 50 ml y 250 ml.



Oxiflex L.A.

Oxitetraciclina Clorhidrato 20% -

Diclofenac Sódico 2,5%.

Antibiótico de amplio espectro.

Larga acción.

Antinflamatorio - Analgésico - Antipirético.

Solución inyectable.

Bovinos y porcinos: 1 ml cada 10 kg.

Aplicar por vía intramuscular profunda.

Presentación: 50 ml y 250 ml.



Oxiflex L.P.

Oxitetraciclina Base 10% -

Diclofenac Sódico 0,5%.

Antibiótico de amplio espectro.

Antiinflamatorio - Analgésico -

Antipirético. Solución inyectable.

Bovinos y porcinos: 1ml cada 10 kg.

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular.

Presentación: 250 ml.



Ceftilon 5

Ceftiofur HCL 5%.

Antibiótico cefalosporínico.

Suspensión inyectable.

Bovinos: 1 ml cada 22 a 45 kg.

Porcinos: 1 ml cada 10 a 17 kg.

Aplicar por vía intramuscular profunda.

Presentación: 100 ml y 250 ml.



Gentalon 6

Gentamicina 6%.

Antibiótico de amplio espectro.

Solución inyectable.

Administrar 1 a 2 ml cada 30 kg de peso vivo (2 a 4 mg/kg) cada 12 horas durante

3 días. En terneros menores de 7 días aplicar la mitad de la dosis. En equinos administrar cada 8 horas.

Aplicar por vía intramuscular o endovenosa lenta.

Presentación: 100 ml.



Tilmilon 300

Tilmicosina Base 30%.

Antibiótico macrólido de amplio espectro.

Solución inyectable.

Bovinos: neumonía 1 ml cada 30 kg.

Queratoconjuntivitis y pietín 1 ml cada 60 kg.

Aplicar por vía subcutánea.

Presentación: 100 ml.





Tiltflex 375

Fosfato de Tilmicosina 30% - Diclofenac Sódico 7,5%.
Antibiótico macrólido de amplio espectro.
Antiinflamatorio - Analgésico - Antipirético. Solución inyectable.
Bovinos: 1 ml cada 30 kg.
Aplicar por vía subcutánea.
Presentación: 100 ml y 250 ml.



Floxanol C Gel Ótico



Ciprofloxacina (como Clorhidrato) 0,8%,
Prednisolona 0,25%, Ketoconazol 2%,
Lidocaína Clorhidrato 2%.
Antibiótico, antifúngico, antiinflamatorio, anestésico.
Tratamiento de otitis externas de etiología bacteriana, alérgica o fúngica.
Caninos y felinos: 0,5 ml en cada conducto auditivo, aunque uno solo sea el afectado.
Presentación: 1 Jeringa dosif. x 10 ml.



Floxanol 5

Enrofloxacin 5%.
Antimicrobiano.
Solución inyectable.
Bovinos y porcinos: 0,5 a 1 ml cada 10 Kg p.v., cada 24 horas de 3 a 5 días.
Caninos y felinos: 1 ml cada 10 Kg p.v., cada 24 horas durante 5 días. Aplicar vía intramuscular o subcutánea.
Presentación: 100 ml.



Floxanol Comprimidos

Enrofloxacin 100 mg.

Antimicrobiano, quimioterápico, quinolona.
Comprimidos.

Caninos y felinos: 1 comp. cada 20 kg.

Presentación: 120 comp. (12 blisters).



Estreptocilin FLEX

Penicilina G Sódica 2.500.000 UI -

Penicilina G Benzatínica 2.500.000UI

Estreptomicina 2 g - Diclofenac 1,25 g

Antimicrobiano - Antiinflamatorio -

Analgésico - Antipirético.

Suspensión inyectable para preparar.

Bovinos, equinos, ovinos y porcinos: 1 ml
cada 25 kg.

Aplicar por vía intramuscular profunda.

Presentación: caja conteniendo 6 frascos
con polvo y 6 frascos con diluyente.



Estreptocilin Forte

Penicilina G Procaínica 5.000.000 UI,

Penicilina G Sódica 5.000.000 UI,

Estreptomicina Sulfato 3.750.000 UI (5g),

Meloxicam 0,3 g, Lidocaína Clorhidrato 0,35 g.

Antimicrobiano, antiinflamatorio,
analgésico, antipirético.

Suspensión inyectable para preparar.

Bovinos y Equinos: 1 frasco cada 500 kg
P.V. Repetir cada 24 a 48 horas según
criterio veterinario.

Aplicar por vía inyectable intramuscular.

Presentación: caja conteniendo 1 frasco
con polvo y 1 frasco con solvente.





Doxilon comprimidos

Doxiciclina 100 mg y 200 mg.
Antibiótico de amplio espectro.

Comprimidos palatables.

Caninos y felinos: 1 Comprimido de 100 mg cada 10 Kg de peso y 1 comprimido de 200 mg cada 20 kg de peso cada 24 hs.

Presentación: Doxilon 100 mg: 120 comprimidos (12 blisters); Doxilon 200 mg: 48 comprimidos. (12 blisters).



Lactamic comprimidos

Cefalexina Monohidrato 500 mg y 1000 mg.

Antibiótico de amplio espectro.

Comprimidos palatables.

Caninos y felinos: 1 comprimido de 500 mg cada 16-20 Kg. 1 comprimido de 1000 mg cada 33-40 kg.


Administrar cada 8 a 12 horas según criterio del profesional actuante.

Presentación: 500 mg: 96 comprimidos (12 blisters); 1000 mg: 48 comp. (12 blisters).





Antidiarreicos



Sultoprim Antidiarreico

Sulfadimidina 20%, Trimetoprim 4%,
Loperamida 0,04%.

Antibiótico - Antidiarreico.

Solución inyectable.


1 ml cada 10 kg de peso.

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular.

Presentación: 100 ml.



LEÓN[®]
PHARMA
LABORATORIO VETERINARIO



Sultoprim[®] Antidiarreico

Sulfadimidina 20% / Trimetoprim 4%
Loperamida 0,04%

Antibiótico antidiarreico.

Solución inyectable.

1 ml cada 10 kg de peso.



Antifúngicos



Sismic-K

Ketoconazol 200 mg.

Antifúngico de acción sistémica.

Comprimidos biranurados.

Caninos y felinos: 1 comprimido cada
20 kg de peso.

Presentación: 120 comp. (12 blisters).



Sismic-K

Antifúngico de acción sistémica.



Comprimidos





Antiinflamatorios



Dexta LP

Dexametasona fosfato sódico 0,2%.
Antiinflamatorio esteroide. Solución inyectable.

Dosis: en casos de shock para todas las especies: 2,2-4,4 mg/kg E.V.

Dosis antiinflamatorias sugeridas:
Equinos, bovinos, ovinos y porcinos: de 0,05 a 0,2 mg/kg.

Caninos y felinos: de 0,1 a 2 mg/kg.
Aplicar por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea.

Presentación: 10 ml x 12 unid. y 100 ml.



Fluxin 5

Flunixin Meglumina 5%.
Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético.

Solución inyectable.

Dosis: bovinos: 2,2 mg/kg.

En diarreas neonatales aplicar 2 a 3 ml por ternero.

Equinos: 1,1 mg/kg. **Porcinos:** 2,2 mg/kg.

Caninos: entre 1,1 y 2 mg/kg. El

tratamiento puede repetirse a las 24 horas. En las especies indicadas, no administrar por más de

3 días consecutivos. Aplicar por vía intramuscular o endovenosa.

Presentación: 10 ml, 50 ml y 100 ml.



Predniflex

Prednisolona 20 mg.

Antiinflamatorio esteroide en comprimidos.

Dosis: procesos inflamatorios y alérgicos: 0,5 a 1 mg/kg/día.

Enfermedades autoinmunes: 2 a 4 mg/kg/día.

Terapia de sustitución: 0,11 a 0,22 mg/kg/día. Estas dosis corresponden a las dosis de inducción.

Presentación: 120 comp. (12 blisters).



Fenodyl Flex

Carprofeno 25 mg, 75 mg y 100 mg.

Antiinflamatorio no esteroideo.

Comprimidos palatables.

Caninos: 4,4 mg de carprofeno/kg peso corporal/día administrada como dosis única diaria o dividida en dos dosis idénticas cada 12 horas.

Presentación:

20 comprimidos de 25 mg (2 blisters)

21 comprimidos de 75 mg (7 blisters)

21 comprimidos de 100 mg (7 blisters)



Defender[®] TOP 90

Fluralaner

Comprimidos masticables.



Garrapaticida - Pulguicida



Antiparasitarios



Ivectina LP1

Ivermectina 1%.

Antiparasitario interno y externo.

Solución inyectable.

Bovinos y camélidos: 1 ml cada 50 kg.

Porcinos: 1 ml cada 33 kg.

Aplicar por vía subcutánea,
en la tabla del cuello.

Presentación: 50 ml y 500 ml.



Tres Quince

Ivermectina 3,15%.

Antiparasitario interno y externo.

Garrapaticida de larga acción.

Solución inyectable.

Bovinos: 1 ml cada 50 kg.

Aplicar por vía subcutánea,
en la tabla del cuello.

Presentación: 500 ml.



Ivectina LP 3,15 Oleosa

Ivermectina 3,15%.

Antiparasitario interno y externo.

Garrapaticida de larga acción en
solución inyectable.

Bovinos y ovinos: 1 ml cada 50 Kg.

Para el control de la sama ovina:
1 ml cada 30 Kg.

Aplicar por vía subcutánea,
en la tabla del cuello.

Presentación: 50 ml y 500 ml.



Defender Top 90 Días

Fluralaner 40%.

Antiparasitario externo, **pulguicida** y **garrapaticida** de larga acción.

Comprimidos masticables.

Caninos: 1 comprimido de la presentación correspondiente.

Administrar justo después de la alimentación o junto con comida.

Presentación: 2 a 4,4 Kg; 4,5 a 10 Kg; 10,1 a 20 Kg; 20,1 a 32 Kg; 32,1 a 64 Kg.



PROTECCIÓN



Defender Top 1 MES

Fluralaner 40%.

Antiparasitario externo, **pulguicida** y **garrapaticida** de larga acción.

Comprimidos masticables.

Caninos: 1 comprimido de la presentación correspondiente.

Administrar justo después de la alimentación o junto con comida.

Presentación: 2,5 a 11 Kg; 11,1 a 22 Kg; 22,1 a 40 Kg; 40,1 a 64 Kg.



PROTECCIÓN



Defender Comprimidos

Spinosad 30%.

Antiparasitario externo, **pulguicida** de rápida acción.

Comprimidos masticables.

Caninos y felinos: 1 a 3 comprimidos según peso del animal. Administrar justo después de la alimentación o junto con la comida.

Presentación: Caninos 2,5 a 5 kg - Felinos 2 a 3 kg; Ca 5,1 a 10 kg - Fe 3,1 a 6 kg; Ca 10,1 a 20 Kg - Fe 6,1 a 12 kg; Ca 20,1 a 40 Kg; Ca 40,1 a 60 Kg.



PROTECCIÓN



PROTECCIÓN
50
DÍAS
GARRAPATAS



Defender spot on

Fipronil 10%, Piriproxifeno 10%.

Antiparasitario externo, **pulguicida, garrapaticida.**

Solución de uso externo, lista para usar.

Caninos: administrar el contenido de una pipeta de acuerdo al kilaje. Aplicar sobre la piel, entre las escápulas.

Presentación: 2 a 10 Kg; 10 a 20 Kg; 20 a 40 Kg; 40 a 60 Kg; más de 60 Kg.



Praziveq Gel

Ivermectina 1%, Praziquantel 5%.

Antiparasitario endectocida.

Gel oral sabor manzana.

Equinos: 1 ml cada 50 kg.

Presentación: 12 ml.



Praziveq Forte

Ivermectina 1,2 %, Praziquantel 15 %.

Antiparasitario endectocida.

Gel oral sabor manzana.

Equinos: 1 g cada 60 kg.

Presentación: 10 g y 30 g.



InterPets Suspensión

Fenbendazol 5,0%, Pamoato de Pirantel 1,45%, Praziquantel 0,5%.

Antiparasitario interno de amplio espectro.

Suspensión oral saborizada.

Caninos y felinos: 1 ml cada 1 kg.

Presentación: 15 ml y 100 ml.



InterPets Comprimidos

Fenbendazol 500 mg, Pirantel Pamoato 50 mg y Praziquantel 50 mg.
Antiparasitario interno de amplio espectro.
Comprimidos saborizados.

Caninos y felinos: 1 comprimido cada 10 kg.

Presentación: 72 comprimidos (12 blisters).



Interfen Suspensión

Fenbendazol 10%.
Antihelmíntico de amplio espectro.
Suspension oral.

Bovinos, ovinos y porcinos: 1 ml cada 20 kg de peso vivo (5 mg/kg).

En caso de tenias y ostertagiasis tipo II:
1,5 ml cada 20 kg (7,5 mg/kg).

Presentación: 1 lt. y 5 lt.



Interalb Suspensión

Albendazol 10%, Sulfato de Cobalto 1,8%.
Antihelmíntico, Fasciolicida.
Suspension oral.

Bovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 100 kg.
Fasciola hepática, ostertagia inhibida y tenias: 10 ml cada 100 kg.

Presentación: 1 lt y 5 lt.





Domectina LP 1

Doramectina 1%.
Antiparasitario interno y externo.

Solución inyectable.

Bovinos: 1 ml cada 50 Kg.

Administrar por vía subcutánea, en la tabla del cuello o región de la paleta.

Presentación: 50 ml y 500 ml.



Tres Quince®

Antiparasitario externo e interno.

Solución inyectable



Garrapaticida



Antisépticos



Cloxidina jabón líquido

Solución de Clorhexidina Digluconato 4%,
Glicerina 7,5%.

Antiséptico y desinfectante.

Jabón líquido para uso externo.

Antisepsia de la piel para antes y
después de cirugías, lavado rutinario y
quirúrgico de manos.

Desinfección de superficies, equipos e
instrumental médico quirúrgico.

Presentación: 500 ml y 5 lt.



Cloxidina shampoo

Solución de Lauril Éter Sulfato de Sodio
20 %, Clorhexidina Digluconato 2,5%,
Cocamidopropil Betaína 3%.

Antiséptico, desinfectante.

Shampoo para uso externo.

Caninos, felinos y equinos.

Presentación: 250 ml y 5 lt.



Cloxidina sellador de pezones

Solución de Clorhexidina Digluconato 1%,
Glicerina 3%

Antiséptico, desinfectante.

Solución para uso externo.

Bovinos, ovinos y caprinos: aplicar
el producto puro por inmersión,
aproximadamente 4 ml por animal
por ordeño.

Presentación: 10 lt y 20 lt.



Cloxidina Spray

Alcohol etílico 73%, solución de Clorhexidina Digluconato 1%.

Antiséptico, desinfectante y sanitizante.

Solución para uso externo.

Caninos, felinos, equinos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: aplicar una o dos veces por día sobre la zona que desea tratar y dejar secar.

Presentación: 30 ml, 250 ml y 1 lt.



Cloxidina Zero Spray

Solución de Clorhexidina Digluconato 1%.

Antiséptico, desinfectante y sanitizante.

Solución para uso externo.

Caninos, felinos, equinos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: aplicar una o dos veces por día sobre la zona que desea tratar y dejar secar.

Presentación: 30 ml, 250 ml y 1 lt.



Fortefos + HIERRO

Suplemento mineral

SOLUCIÓN INYECTABLE



- ✓ Fósforo
- ✓ Calcio
- ✓ Cobre
- ✓ Cobalto
- ✓ Magnesio
- ✓ Zinc
- ✓ Potasio
- ✓ Hierro



Reproductivos



Estracip 100

Cipionato de Estradiol 0,1%.
Hormonal inductor y sincronizador de celo.

Solución inyectable.

Consultar dosis en prospecto según
indicación deseada y especie a tratar:

**Bovinos, equinos, porcinos, ovinos,
caninos y felinos.**

Aplicar por vía intramuscular.

Presentación: 50 ml.



Estraben 100

Benzoato de Estradiol 0,1 %.
Hormonal inductor y sincronizador de celo.

Solución inyectable.

Bovinos: 1 a 2,5 ml por animal.

Aplicar por vía intramuscular.

Presentación: 100 ml.



CEL-ON

Parche detector de celo.

Aumenta la tasa de detección de celo
del rodeo notablemente por su fácil uso
e interpretación.

Aumenta la tasa de concepción por una
mejor calidad en la detección de celo.

Aumento sustancial de la tasa de preñez.
Facilita y simplifica el manejo reproductivo,
brindando una herramienta sencilla,
práctica, de bajo costo y alto beneficio.

Presentación: paquetes de 50 unidades.



D+Tenol

D+Cloprostenol 0,0075 %.

Prostaglandina sintética.

Agente luteolítico.

Solución inyectable.

Bovinos: 2 ml por animal.

Porcinos: 1 ml por animal.

Ovinos: 0,5 ml por animal.

Aplicar por vía intramuscular.

Presentación: 20 ml y 50 ml.



Busacet

Buserelina acetato 0,000042%.

Hormonal, inductor de la ovulación.

Solución inyectable.

Vacas: 2,5 a 5 ml totales

Yeguas: 10 ml totales.

Administrar por vía intramuscular profunda, subcutánea o intravenosa.

Equinos: utilizar preferentemente la vía intravenosa.

Presentación: 10, 25 y 50 ml





Disposint 600

Progesterona 600 mg.
Sincronización del celo en vacas
y vaquillonas (IATF).
Dispositivo intravaginal para bovinos.
Presentación: 10 unidades.



Disposint 1200

Progesterona 1200 mg.
Sincronización del celo en vacas
y vaquillonas (IATF).
Dispositivo intravaginal para bovinos.
Presentación: 10 unidades.





Vitamínicos y mineralizantes



Fortemax Complemento con Selenio

**Calcio + Fósforo + Zinc + Selenio +
Cobre + Cobalto + Vitamina B12 +
Vitamina D3.**

Suplemento preventivo y terapéutico.

Mineralizante vitamínico.

Solución inyectable.

Bovinos adultos: 10 ml por animal.

Terneros: 5 ml por animal.

Aplicación por vía subcutánea.

Presentación: 50 ml, 250 ml y 500 ml.



Fortefos + HIERRO

**Calcio + Fósforo + Zinc + Cobre +
Cobalto + Magnesio + Potasio + Hierro.**

Suplemento preventivo y terapéutico.

Mineralizante.

Crecimiento y reproducción de los bovinos.

Solución inyectable.

Bovinos adultos: 10 ml por animal.

Terneros: 5 ml por animal.

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular.

Presentación: 500 ml.



Fortesel ADE + Zinc

Sodio Selenito 0,347%, Sodio Hipofosfito 15%, Zinc Gluconato 2%, Vitamina A Palmitato 750.000 U.I., Vitamina D3 600.000 U.I., Vitamina E Acetato 2500 U.I.
Tratamiento y prevención de estados carenciales de Selenio, Fósforo, Zinc, Vitaminas A, D3 o E.
Solución inyectable.

Bovinos: aplicar 1 ml c/50 kg. de peso vivo.
Aplicación por vía subcutánea.

Presentación: 500 ml.



Cuprozinc Forte

Cobre metálico 1,5%, Zinc metálico 5%.
Tratamiento y prevención de estados carenciales de Cobre y Zinc.
Solución inyectable.

Terneros/as hasta 200kg: aplicar 1 ml cada 50 kg.

Novillos y vaquillonas: administrar 4 ml por animal.

Vacas: administrar 5 ml por animal.

Toros: administrar 6 ml por animal como dosis máxima.

Aplicar por vía subcutánea.

Presentación: 500 ml.





Fortecal Magnesiado

Calcio gluconato 25%, Magnesio Cloruro 15%, Glucosa 10%.

Recalcificante y energético.

Tratamiento y prevención de deficiencias de Calcio y Magnesio.

Solución inyectable.

Bovinos y equinos: 200 a 300 ml por animal.

Bovinos (hipocalcemias agudas):

400 a 800 ml por animal.

Ovinos y caprinos: 25 a 50 ml por animal.

Porcinos: 50 a 100 ml por animal.

Caninos: 5 a 10 ml por animal.

Felinos: 2,5 a 5 ml por animal.

Aplicar por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa lenta.

Presentación: 500 ml.



Fortevit ADE

Vitamina A Palmitato 25.000.000 UI,

Vitamina D3 5.000.000 UI,

Vitamina E 5.000 UI.

Vitamínico.

Solución inyectable.

Bovinos: 1,5 ml a 3 ml cada 100 kg.

Porcinos: 1,5 ml cada 100 kg. Ovinos y

caprinos: 1,0 ml cada 50 kg.

Equinos: 1,0 ml cada 100 kg.

Caninos: 1,0 ml cada 20 kg.

Felinos: 0,5 ml cada 4 kg.

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular.

Presentación: 100 ml.





Belleza





León Shampoo Belleza

Lauril Éter Sulfato de Sodio (al 70%),
Cocamidopropil Betaina.
Shampoo de higiene y belleza
para uso externo.

Caninos, felinos y equinos.

Presentación: 250 ml y 5 lt.



León Perfume

Esencia Mama ET Bebe.
Solución desodorizante.
Uso externo.

Caninos y felinos: aplicar a 20 cm de
distancia sobre el pelaje de tu mascota.

Presentación: 200 ml.



Domectina[®] LP 1

Antiparasitario interno y externo

Solución inyectable



500
ml

50
ml

Doramectina 1%



www.leonpharma.com

